

**Будьте готовы каждый раз заново устанавливать контакт и доверительные отношения, даже если деменцией страдает самый близкий, родной человек.**

#### Можно и нужно

 Задавать простые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет».

 Смотреть человеку в глаза, не теряя контакта.

 Помнить о достоинстве человека: он болеет и многое не понимает.

 Соблюдать привычные ритуалы – устраивать семейные обеды, вечерние прогулки и т. д.

 Давать человеку какое-то дело (вытирая пыль, переставлять книги) – он будет чувствовать себя занятым и нужным.

 Говорить кратко и понятно: одна мысль = одна фраза.

 Не торопиться с ответом, дайте больному время понять услышанное.

 Всегда исходить из реакции и состояния больного.

 С осторожностью вводить в жизнь больного новое – одежду, мебель, предметы обихода, быть осмотрительным, знакомя больного с людьми.

 Включать больному музыку и песни из его молодости, показывать любимые фильмы, развесить семейные фотографии.

#### Нельзя

 Кричать на больного.

 Разговаривать как с ребенком.

 Говорить: «Я же тебе рассказывал(а)!», «Ты что, забыл(а)?».

 Привязывать больного к кровати.

#### Позаботьтесь о себе

 Не обижайтесь на человека с деменцией.

 Не вините себя.

 Не стесняйтесь просить о помощи близких и/или профессионалов.

 Помните, что вам тоже нужен отдых.

 Поступайте с больным человеком так, как хотите, чтобы поступали с вами.

Научный консультант:  
Л. Андрев, БФ «Старость в радость», РУДН.

# Особенности общения с людьми с деменцией

**Ухаживать за человеком с деменцией очень непросто. Мы поможем вам оставаться чутким и деликатным до самого конца.**

Человек с деменцией живет прошлым.

Общаясь с ним, важно это понимать и знать его биографию и прежние интересы.



#### Больной деменцией

- многое не помнит;
- может не узнавать родных;
- живет в своем мире;
- часто не может выразить свои потребности и рассказать о боли;
- бывает агрессивным и раздражительным.



Беспокойство и раздражение больного могут быть признаками боли, которую он не способен описать словами.



Деменция — это болезнь; постараитесь не стесняться своего близкого.



Ваша логика здорового человека не поможет понять поведение больного.



Больной деменцией живет в вымышленном мире, создайте для этого мира безопасную среду и не пытайтесь вернуть его к реальности.



Дайте человеку возможность выражать свои чувства.



Если вы поместили вашего близкого в специальное учреждение для больных деменцией, это не означает, что вы плохой родственник.



фонд помощи хосписам

**Вера**

Мастерская заботы

Горячая линия помощи неизлечимо больным людям

Веб-сайты

8 (800) 700-84-36

[www.fond-vera.ru](http://www.fond-vera.ru)  
[www.pro-palliativ.ru](http://www.pro-palliativ.ru)

# Распространенные ситуации

## 1 Больной не узнает своих родных



- Познакомьтесь: поздоровайтесь и представьтесь.
- Успокойте: говорите мягко, будьте готовы повторять несколько раз.
- Будьте рядом и сохраняйте зрительный контакт.
- Переключите внимание человека на что-то другое (пейзаж за окном, погоду).



- Не расстраивайтесь, что вас не узнали.
- Не переубеждайте, что вы не мама.
- Не играйте в маму.

## 2 Навязчивое состояние



- Переключите внимание человека с тревожащей темы на что-то другое (погода, ТВ-передачи).



- Не переубеждайте и не оправдывайтесь. Это может спровоцировать агрессию.



- Если больной злится, попросите прощения, объясните ситуацию. Так вы расположите к себе человека.



- Спросите о детях. Пусть ваш близкий выскажет. Скорее всего, после этого он(а) забудет о проблеме. Не ищите в его (ее) поступках логику.



- Ни в коем случае не начинайте искать детей! Это может привести к повышению тревожности и агрессии.

## 3 Перекладывание вещей с места на место




- Оставьте минимум вещей и позвольте их перекладывать. Для вашего близкого это почему-то важно.



- Не прячьте вещи.
- Не ругайте человека.
- Не обесценивайте его действия.

## 4 Агрессивное поведение




- Дайте больному высказать свое недовольство.
- Если чувствуете, что не справляетесь, лучше выйтите из комнаты.



- Не оправдывайтесь.
- Извинитесь.
- Не прерывайте.
- Не отвечайте агрессией на агрессию.

## 5 Вызывающее поведение

(например, больной раздевается)




- Отвлеките, заинтересуйте одеждой.
- Поймите, что больному не стыдно, он(а) находится в своем мире.
- Если больной демонстрирует сексуальное поведение, подумайте, возможно, вы сегодня иначе выглядите и кого-то напоминаете. Можно сменить одежду.



- Не ругайте и не говорите: «Как тебе не стыдно?»
- Не принимайте это поведение на свой счет.

## 6 Отказ от еды



- Предложите помочь вам с приготовлением пищи. Запах и вид еды поможет вызвать аппетит.
- Предложите поесть вместе, возможно, он(а) не хочет есть в одиночестве.
- Если у больного регулярные проблемы с аппетитом, проконсультируйтесь с врачом, возможно, проблема не в деменции.




- Не кормите насильно.

## 7 Отказ от приема лекарств



Больной не знает, что болеет. Его поведение подобно реакции здорового человека, которому в ресторане официант неожиданно принес таблетки.



- Постарайтесь дать лекарства между делом, например, во время обеда.
- Подождите, пока человек выпьет их самостоятельно.
- Можно положить таблетку в ложку с йогуртом, чтобы легче было проглотить лекарство.



- Не давайте лекарства силой, найдите другой способ.