

## Уход за мочеприемником



Опорожняйте мочеприемник каждые 3–4 часа (или по необходимости), а также перед принятием душа. Не допускайте переполнения мочеприемника!



Можно добавить в мочеприемник специальные нейтрализаторы запаха (3–4 капли).



После замены мочеприемника убедитесь, что моча в него поступает.



Меняйте мочеприемник каждые 2–3 дня.

Проконсультируйтесь с врачом, как часто это нужно делать.



Перед сменой мочеприемника тщательно вымойте руки с мылом и обработайте место присоединения мочеприемника любым антисептическим раствором.



Использованный мочеприемник можно промыть водой, высушить и применить вновь.



На ночь можно присоединять к катетеру специальныеочные мочеприемники.

Они имеют больший объем, что позволяет не вставать для слияния мочи.

### Почему отток мочи по катетеру уменьшился или прекратился:



произошел перегиб катетера или трубки мочеприемника;



просвет катетера засорился;



человек потребляет недостаточно жидкости;



мочеприемник зафиксирован слишком высоко (опустите его ниже уровня мочевого пузыря);



состояние больного ухудшилось, возможны проблемы с почками.



### Обратитесь к врачу, если у больного наблюдается:

- подтекание мочи из уретры;
- боль внизу живота;
- повышение температуры;
- уменьшение количества выделенной мочи;
- изменение цвета мочи или появление резкого неприятного запаха;
- появление отека и красноты вокруг места установки катетера;
- примесь крови, осадок или хлопья в моче.



Поступайте с больным человеком так, как хотите, чтобы поступали с вами.


#### Научные консультанты:

И. А. Филонова, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»; Е. А. Мамленкова, АО «Европейский Медицинский Центр»; А. Н. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

# Уход за мочевым катетером

Если вы ухаживаете за человеком с мочевым катетером, соблюдайте правила использования катетера и ухода за ним.

Мочевой катетер – это специальная трубка, которая вводится в мочевой пузырь через уретру; катетер необходим для вывода мочи из организма человека, который не может мочиться самостоятельно.



### Обратитесь к врачу:



если зуд, раздражение, дискомфорт или жжение в уретре не проходят через сутки после установки катетера;



чтобы уточнить, в каких случаях и как часто надо менять катетер.



фонд помощи хосписам

**Вера**



Мастерская заботы

Горячая линия помощи неизлечимо больным людям

Веб-сайты

8 (800) 700-84-36  
[www.fond-vera.ru](http://www.fond-vera.ru)  
[www.pro-palliativ.ru](http://www.pro-palliativ.ru)

# Жизнь с мочевым катетером

## Можно

Спокойно пить любимые напитки.

Вести привычный образ жизни.

Принимать душ (не ванну) и плавать.

Возможно раздражение от соленой воды/хлорки в наружном отверстии уретры, возникновение неприятных ощущений.

Во время менструации женщинам можно использовать привычные средства гигиены.

- При креплении мочеприемника к кровати важно, чтобы трубка катетера и мочеприемник не перегибались.

## Гигиенические процедуры

**Правильный уход за катетером минимизирует риск инфицирования мочевыводящих путей.**

### Интимная гигиена

• Необходимо мыть зону промежности теплой водой 2 раза в день и по необходимости.

• После каждого опорожнения кишечника необходимо подмывание для предотвращения инфицирования:

у женщин моющие движения должны быть от лобка вниз и только в одном направлении, чтобы не занести инфекцию в мочевые пути;

у мужчин при проведении гигиенических процедур необходимо обнажать головку полового члена, после обработки закрывать ее крайней плотью.

## Следите за питьевым режимом:

Поддерживайте количество выпиваемой жидкости, рекомендованное врачом.

Всегда учитывайте состояние больного.

Советуйтесь с врачом.

!  
При недостаточном количестве потребляемой жидкости высок риск воспаления мочевыводящих путей и образования осадка в моче.



## Как крепить мочеприемник к ноге:

• Используйте специальный пояс или ремешки для удобной фиксации.



• Рекомендуется выбирать широкую одежду. Мочеприемник, закрепленный на бедре или под коленом, не должен быть сдавлен.

• Крепление нужно делать ниже уровня мочевого пузыря. Иначе моча из резервуара может попасть обратно в мочевой пузырь и привести к инфицированию мочевыводящей системы.

## Важно

• Если больной без сознания, страдает от деменции или чрезмерно тревожится, следите, чтобы он не выдернул катетер. Существует специальное белье с застежками, не позволяющее больному достать до катетера.

• Следите, чтобы катетер не прилегал долго к коже в одном положении. Иначе в месте прилегания может образоваться пролежень.

• Никогда не тяните за катетер!

• Предотвращайте ситуации, при которых возможно непреднамеренное удаление катетера.

Например, если больной наступает на трубку мочеприемника. Это причинит острую боль человеку и приведет к травме и осложнениям.

## Душ



Можно принимать душ с первого дня ношения катетера.



Для удобства опорожните мочеприемник перед принятием душа.



Промывайте кожу вокруг катетера теплой водой с детским или рН-нейтральным мылом.



## Как защитить катетер от попадания воды внутрь:

### Вариант 1

1 Отсоединить мочеприемник, зажав катетер специальной клипсой (продается в аптеке).

2 После душа тщательно просушить наружную часть катетера, наружные половые органы и мочеприемник чистым полотенцем или салфетками.

### Вариант 2

1 Опорожнить мочеприемник (или заменить на новый) и прикрепить его к ноге ремешками.

2 После душа тщательно просушить наружную часть катетера, наружные половые органы и мочеприемник чистым полотенцем или салфетками (или сменить мочеприемник).

## Нельзя



Допускать попадания воды в катетер.



Использовать вату и ватные диски при обработке кожи вокруг катетера.

Они оставляют волокна и могут спровоцировать воспаление.



Промывать катетер водой или другими средствами.

Можно занести инфекцию в мочевыводящие пути.



Принимать ванну или париться в бане.